

50

ΜΙΓΜΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η τροφή **№ 50** χορηγείται κατά βούληση σε **κουνέλια πάχυνσης** από τη 45^η - 50^η ημέρα της ζωής τους έως και 5 ημέρες πριν τη σφαγή.

Περιέχει κοκκιδιοστατικό. Για τις ανάγκες των 5 τελευταίων ημερών χορηγείστε το μίγμα **№ 50X** (πάχυνσης κουνελιών άνευ κοκκιδιοστατικού).

ΣΥΝΘΕΣΗ

Μηδικάλειρο, δημητριακοί καρποί (κριθάρι), σογιάλειρο γενετικά τροποποιημένο, υποπροϊόντα δημητριακών (πίτυρα), ηλιάλειρο, ζαχαρόπιτα, μελάσα, μαγιά, ανθρακικό ασβέστιο, φωσφορικό μονο-ασβέστιο, αλάτι, αμινοξέα, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %

ΟΛ. ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	17,00	ΟΛ. ΤΕΦΡΑ	10,00
ΟΛ. ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	3,30	ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)	1,10
ΟΛ. ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ	17,00	ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)	0,60
ΥΓΡΑΣΙΑ	12,00	ΝΑΤΡΙΟ (Na)	0,24

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΝΑ Kg

Βιταμίνη Α (Ρετινόλη)	12.000	I.U.	Mn ΜΑΓΓΑΝΙΟ : Mn(II)Oxide	65	mg
Βιταμίνη D ₃ (Χολοκαλσιφερόλη)	2.000	I.U.	Zn ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ : ZnOxide	80	mg
Βιταμίνη Ε (α-τοκοφερόλη)	75	mg	Fe ΣΙΔΗΡΟΣ : Fe(II)Sulphate	80	mg
Βιταμίνη Κ ₃ (Μεναδιόνη)	3	mg	Cu ΧΑΛΚΟΣ : CuSO ₄ .5H ₂ O	15	mg
Βιταμίνη Β ₁ (Θειαμίνη)	2	mg	I ΙΩΔΙΟ : K-Iodide	1,10	mg
Βιταμίνη Β ₂ (Ριβοφλαβίνη)	6	mg	Co ΚΟΒΑΛΤΙΟ:Co(II)Carbonate	1	mg
Βιταμίνη Β ₆ (Πυριδοξίνη)	3	mg	Se ΣΕΛΗΝΙΟ : Na-Selenite	0,08	mg
Βιταμίνη Β ₁₂ (Κυανοκοβαλαμίνη)	20	mcg			
ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ ΟΞΥ	60	mg			
ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ	15	mg			
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ	1,50	mg			
ΒΙΟΤΙΝΗ	200	mcg	ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ		+++
ΧΟΛΙΝΗ	1.000	mg	ΚΟΚΚΙΔΙΟΣΤΑΤΙΚΟ		+++

ΜΟΡΦΗ : Κύβος (pellets)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 25, 40 Kg

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΑΕ εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα **ISO 9001:2008** και **ISO 22000:2005** (HACCP) πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS.

Κωδικός Έγκρισης ΕΕ : **αEL6100001**.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στους Γεωτεχνικούς της Εταιρείας 010612