

87

ΜΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΟΡΤΥΚΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η τροφή ανάπτυξης-πάχυνσης ορτυκίων χορηγείται στα ορτύκια από την πρώτη ημέρα έως 1 ημέρα πριν τη σφαγή τους και είναι ισορροπημένη ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των ορτυκίων, επιτυγχάνοντας το μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης με την ελάχιστη κατανάλωση τροφής. Παράλληλα δίνει άριστες αποδόσεις και ποιότητα σφαγίου. **Περιέχει κοκκιδιοστατικό.**

ΣΥΝΘΕΣΗ

Δημητριακοί καρποί (καλαμπόκι), σογιάλευρο γενετικά τροποποιημένο, σογιέλαιο, μαγιά, ανθρακικό ασβέστιο, φωσφορικό μονο-ασβέστιο, αλάτι, διττανθρακικό νάτριο, αμινοξέα, φυτάση, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %

ΟΛ. ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	25,00	ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)	1,00
ΟΛ. ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	4,20	ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)	0,77
ΟΛ. ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ	3,00	ΝΑΤΡΙΟ (Na)	0,19
ΟΛ. ΤΕΦΡΑ	6,20	ΜΕΘΕΙΟΝΙΝΗ (Met)	0,56
ΥΓΡΑΣΙΑ	12,00	ΛΥΣΙΝΗ (Lys)	1,40

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΝΑ Kg

Βιταμίνη Α (Ρετινόλη)	13.500	I.U.	Mn ΜΑΓΓΑΝΙΟ : Mn(II)Oxide	120	mg
Βιταμίνη D ₃ (Χολοκαλσιφερόλη)	5.000	I.U.	Zn ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ : ZnOxide	100	mg
Βιταμίνη Ε (α-τοκοφερόλη)	100	mg	Fe ΣΙΔΗΡΟΣ : Fe(II)Sulphate	40	mg
Βιταμίνη Κ ₃ (Μεναδιόνη)	4	mg	Cu ΧΑΛΚΟΣ : CuSO ₄ .5H ₂ O	20	mg
Βιταμίνη Β ₁ (Θειαμίνη)	2,60	mg	I ΙΩΔΙΟ : K-Iodide	1	mg
Βιταμίνη Β ₂ (Ριβοφλαβίνη)	8	mg	Se ΣΕΛΗΝΙΟ : Na-Selenite	0,30	mg
Βιταμίνη Β ₆ (Πυριδοξίνη)	3	mg	Co ΚΟΒΑΛΤΙΟ:Co(II)Carbonate	0,20	mg
Βιταμίνη Β ₁₂ (Κυανοκοβαλαμίνη)	15	mcg			
ΝΙΚΟΤΙΝΙΚΟ ΟΞΥ	85	mg			
ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ	22	mg			
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ	2	mg	3-Φυτάση (EC 3.1.3.8.)	500	FTU
ΒΙΟΤΙΝΗ	200	mcg	ΚΟΚΚΙΔΙΟΣΤΑΤΙΚΟ : Diclazuril	1	mg
ΒΙΤΑΜΙΝΗ C (Ασκορβικό οξύ)	10	mg	ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ	+++	
ΧΟΛΙΝΗ	500	mg			

ΜΟΡΦΗ : Τραχανάς (crumbles)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 40 Kg

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΑΕ εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα **ISO 9001:2008** και **ISO 22000:2005** (HACCP) πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS.

Κωδικός Έγκρισης ΕΕ : **αEL6100001**.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στους Γεωτεχνικούς της Εταιρείας 010612